

Xilazin

Cloridrato Xilazina 2%

Uso Veterinário
Solução Injetável

Ação:

Analgésico, anestésico, miorreaxante e sedativo para bovinos, caninos, equinos, felinos.

Fórmula:

Cada 100 mL contém:
Xilazina (Cloridrato).....2g
Veículo q.s.p.....100mL

Indicação de uso:

A Xilazina exerce atividades analgésica, anestésica e sedante, mas caracteriza-se por sua acentuada ação miorreaxante a nível central, sendo usada em grande escala para a contenção farmacológica em animais.

Farmacologia e Toxicologia:

Produz um estado de sonolência, acompanhado de moderada ação analgésica nas diferentes espécies animais. Xilazin não causa dependência física ou psíquica em doses terapêuticas. Sobre a flora normal pode provocar ocasionalmente uma expulsão de fezes pastosas ou líquidas, nada se observou a resistência aos agentes patogênicos e discrasias sanguíneas. Não possui efeitos de natureza carcinogênica, teratogênica ou mutagênica. A meia vida de eliminação da Xilazina é de aproximadamente 50 minutos em equinos, 30 minutos em ovinos, 40 minutos em caninos e 45 minutos em bovinos. Dependendo da dosagem no bovino, a eliminação é de aproximadamente 36 horas.

Aplicação e Posologia:

CANINOS E FELINOS: Avia de administração pode ser intramuscular e endovenosa, na dosagem de até 4 mg/kg, para executar suturas, extrações dentárias, limpeza de tártaros, retirada de pontos, coleta de sangue e urina, exames radiológicos, raspados de pele, limpeza de feridas cirúrgicas, limpeza de ouvidos e outras intervenções mais dolorosas. Nesta dosagem, Xilazin produz sedação que mantém por 1 a 2 horas analgesia de 15 a 30 minutos.

EQUINOS: Avia de administração pode ser intramuscular e endovenosa, na dosagem de até 1,6 mg/kg para pesagem, radiografia, transporte, tratamento de cascos para facilitar palpação retal e tranquilizar as éguas; e intervenções cirúrgicas rápidas.

BOVINOS: A via de administração pode ser intramuscular e endovenosa.

- Dose de até 0,05 mg/kg permite nítida sedação para executar extração de agrantes, facilitar a realização de anestésias locais, rumenotomia, laparotomia, cesariana, redução do prolapso de útero, facilitação de embriotomia, mudanças de pensos e tratamento intramamário.

- Dose de até 0,1 mg/kg permite forte sedação para executar exames na cavidade bucal, abertura de abscessos, suturas superficiais de feridas e desobstrução do canal dos tetos, tratamento de cascos, colocação de argolas nas narinas e lavagens do prepúcio.

- Dose de até 0,2 mg/kg permite sedação muito intensa, analgesia e relaxamento muscular para amputação de chifres e cascos, operação cesariana em decúbito, eliminação das contrações pós-parto, sutura dos tetos, castrações, punções, colocação de gesso e marcação cutânea a ferro. É recomendável jejum de algumas horas a partir desta dosagem.

- Dose de até 0,3 mg/kg permite sedação muito intensa, a ponto do animal não se conservar em pé, para intervenções.

Associações com outros produtos:

CANINOS E FELINOS: O Xilazin pode ser associado com cloridrato de cetamina, como pré-anestésico com barbitúricos e com anestésicos locais para intervenções cirúrgicas mais profundas.

EQUINOS: O Xilazin pode ser associado com cloridrato de cetamina, como pré-anestésico com barbitúricos e com anestésicos locais para intervenções cirúrgicas difíceis e dolorosas.

Precauções

Em animais idosos, gestantes, desidratados, produtores de alimentos e com obstrução urinária, a dose deve ser reduzida e só usado quando não houver opção mais segura. O Cloridrato de Xilazina deve ser injetado lentamente para não ocorrer efeitos indesejáveis; convém ter sempre à mão material para quaisquer emergências. O efeito sedativo pode ser reduzido por ruídos, intranquilidade, manipulação no animal, etc.

Contraindicações:

Xilazin deve ser cuidadosamente controlado nos animais debilitados, com respiração deprimida, cardiopatia, enfraquecimento renal e hepático, choque ou quaisquer outras condições de estresse. A droga é contraindicada em animais durante o último mês de prenhez (por precipitar um parto precoce ou aborto) e em bovinos desidratados. Não aplicar em animais destinados ao consumo humano.

ATENÇÃO: PERÍODO DE CARÊNCIA
BOVINOS: ABATE - NÃO APLICAR EM ANIMAIS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO.
LEITE - ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER APLICADO EM FÊMEAS PRODUTORAS DE LEITE PARA CONSUMO HUMANO.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

Apresentação:

Frasco-ampola com 10 mL contendo solução injetável a 2% de Xilazina (Cloridrato). Deve-se conservar o produto em lugar seco e fresco, ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance de crianças.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob o nº 7.899 em 14/08/2001.

Responsável técnica:

Dra. Patrícia Alves Felipe Pereira - CRF/SP 52.491

Proprietário:

Syntec do Brasil Ltda.
Rua Soluções do Lar, 105 - Jd. Rio Cotia
Cotia/SP - CEP: 06716-105
CNPJ: 02.177.011/0002-58
Indústria Brasileira

Fabricante:

Rhobifarma Indústria Farmacêutica Ltda.
Rua Calêndula, 250 - Jd. Boa Vista
Hortolândia/SP - CEP: 13187-044
CNPJ: 04.913.008/0001-08



www.syntecvet.com.br

V-001

Xilazin 10 ml - Bula

cores:

■ Preto

prosigno comunicação design